

### Avant la vaccination

### ORGANISATION TYPE DU TROD SÉROLOGIQUE PRIMOVACCINATION OU EN RAPPEL

**NON OBLIGATOIRE MAIS  
FORTEMENT RECOMMANDÉ**



- Personnes de 12 à 55 ans immunocompétentes
- Personnes plus âgées, à leur demande et selon l'appréciation d'un professionnel de santé responsable de la vaccination

Personnes disposant d'un **justificatif d'infection** passée à la Covid-19 : résultat de test RT-PCR ou TAG ou sérologique de **plus de 2 mois**

**NON**

**VACCINATION**  
Schéma à **2 DOSES**  
sans TROD



Vérification lors de l'entretien pré-vaccinal de la présence d'un antécédent d'infection à SARS-CoV-2

**NON**

**OUI**

**VACCINATION**  
Schéma à **UNE DOSE**  
sans TROD



Réalisation d'un TROD en amont ou au moment de l'injection de la 1<sup>ère</sup> dose de vaccin

Attente entre 10 et 20 minutes  
(selon notice fabricant)

- ✓ Tutoriel d'utilisation des TROD sérologiques : <https://www.dailymotion.com/video/x827m0i>
- ✓ Intégration du TROD sérologique dans le parcours vaccinal : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche\\_integration\\_du\\_trod\\_serologique\\_dans\\_le\\_parcours\\_vaccinal.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_integration_du_trod_serologique_dans_le_parcours_vaccinal.pdf)

**SCHÉMA DE RAPPEL :**  
Pas d'injection :  
1 infection Covid = 1 injection

Lecture du résultat du TROD

**TROD positif**


**TROD négatif**

- Saisie dans **Vaccin-Covid**
- Remise de l'**attestation de vaccination** indiquant un schéma complet
- Annulation du 2<sup>nd</sup> RDV

**VACCINATION**  
Schéma à **UNE DOSE**



**VACCINATION**  
Poursuite du parcours vaccinal à **2 DOSES**



- Saisie dans **Vaccin-Covid**
- Remise de documents (synthèse vaccinale et attestation)

- Ministère des solidarités et de la santé : Intégration du TROD sérologique dans le parcours vaccinal : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche\\_integration\\_du\\_trod\\_serologique\\_dans\\_le\\_parcours\\_vaccinal.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_integration_du_trod_serologique_dans_le_parcours_vaccinal.pdf)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : Art 5 et 15 : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-05-07>
- Stratégie vaccinale : priorisation des personnes éligibles / Liste des comorbidités / Liste des professionnels de santé concernés par la vaccination : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19>
- HAS 30/04/21 : Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Vaccination prioritaire de l'entourage des personnes immunodéprimées contre le SARS-Cov 2 : [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3264056/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-prioritaire-de-l-entourage-des-personnes-immunodeprimees-contre-le-sars-cov-2](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264056/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-prioritaire-de-l-entourage-des-personnes-immunodeprimees-contre-le-sars-cov-2)
- DGS-Urgent n°2021-77 05/08/21 : Modalités de mise en œuvre du dépistage pré-vaccinal par tests de détection des anticorps sériques dirigés contre le SARS-CoV2 dans le cadre du schéma vaccinal complet à une dose : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent\\_77\\_serologie\\_prevaccinale\\_monodose-2.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_77_serologie_prevaccinale_monodose-2.pdf)
- Avis n° 2021.0055/AC/SEAP du 26 juillet 2021 du collège de la HAS relatif aux tests de détection des anticorps sériques dirigés contre le coronavirus en contexte de dépistage pré-vaccinal : [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3280170/fr/avis-n-2021-0055/ac/seap-du-26-juillet-2021-du-college-de-la-has-relatif-aux-tests-de-detection-des-anticorps-seriques-diriges-contre-le-coronavirus-en-contexte-de-depistage-pre-vaccinal](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3280170/fr/avis-n-2021-0055/ac/seap-du-26-juillet-2021-du-college-de-la-has-relatif-aux-tests-de-detection-des-anticorps-seriques-diriges-contre-le-coronavirus-en-contexte-de-depistage-pre-vaccinal)
- Covid-19 : quelle protéine virale les TROD doivent-ils cibler en sérologie pré-vaccinale ? [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3280300/fr/covid-19-quelle-proteine-virale-les-trod-doivent-ils-cibler-en-serologie-pre-vaccinale](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3280300/fr/covid-19-quelle-proteine-virale-les-trod-doivent-ils-cibler-en-serologie-pre-vaccinale)

**Avant l'injection**



**Eligibilité du patient selon stratégie vaccinale<sup>1</sup>**

**Primovaccination et rappel des personnes ≥ 12 ans<sup>2</sup>**

- Connexion **VACCIN-COVID<sup>3</sup>** : (vérifier si patient déjà vacciné)
- **Questionnaire de santé<sup>4</sup>**


Infection Covid ou TAG+ ou PCR+ au cours des **2 derniers mois**

**Vaccination possible après un délai de 2 mois**  
→ 1 dose unique si immuno-compétente

Autre vaccin à réaliser ou reçu récemment

**Aucune adaptation nécessaire<sup>6</sup>**

- **Peu fréquents** : lymphadénopathie, prurit au site d'injection, malaise, réaction d'hypersensibilité, insomnies, douleur des extrémités, diminution appétit, léthargie, hyperhidrose, sueurs nocturnes, asthénie
- **Rares** : paralysie faciale périphérique aiguë
- **Très rares** : myocardite, péricardite



- Précautions<sup>5</sup>**
- Personne avec un trouble de l'hémostase
  - Femme enceinte
  - Personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1<sup>ère</sup> injection
- Orientation Médecin traitant ou Sage-femme**

**Non éligible en pharmacie (prescription ou administration) Cf. page 3**

- Présence de fièvre, maladie aiguë
- Traitement par anticorps monoclonaux
- Myocardites ou péricardites suite à vaccination et toujours évolutives

- Report de la vaccination**
- **Très fréquents** : douleur, gonflement au site d'injection, fatigue, frissons, fièvre, arthralgies, myalgies, céphalées, diarrhée
  - **Fréquents** : rougeur au point d'injection, nausées, vomissements
  - **Indéterminés** : anaphylaxie, gonflement étendu d'un membre vacciné, du visage, érythème polymorphe, paresthésie, hypoesthésie

**L'injection**



**Recueil du consentement du patient<sup>7</sup>**

**Pas de vaccination à l'officine**

- Utiliser une technique d'asepsie rigoureuse
- Vérifier l'aspect : Dispersion de couleur blanche à blanc cassé, exempte de particules visibles
- **PAS DE DILUTION**
- Prélever 0,3mL de solution du flacon multidose avec 1 seringue et 1 aiguille appropriée
- Étiqueter le flacon de l'heure de reconstitution ou la seringue : nom du vaccin, n° lot, date et heure limite d'utilisation

**OUI**

**Préparation à l'injection**

- Port du masque, désinfection des surfaces
- Gants (non obligatoire mais recommandé)
- Compresses stériles + antiseptique
- Pansement
- Boîte de recueil DASRI<sup>8</sup>
- Trousse de secours
- Lavage des mains

**Préparation du vaccin<sup>9</sup> Cf. page 4**

- Position assise de la personne
- Repérage de la zone d'injection
- Désinfection avec temps de contact et séchage du produit adapté

- Absence de problème cutané au point d'injection : cicatrice, inflammation, démangeaisons, douleur... \*
- Personne avec tatouage : ne pas piquer dans l'encre
- Personne avec curage axillaire : vacciner côté opposé

**Personne sous anticoagulants**

**NON**

**Injection IM dans le deltoïde<sup>10</sup>**

- **Injection IM dans le deltoïde<sup>10</sup>**
- Aiguille petit calibre
- Pression point injection 2' sans masser ni frotter
- Information : risque hématome

**Après l'injection**

Réactions locales (œdème, rougeur, induration) ou transitoires (fièvre, douleur) → Traitement symptomatique : application de froid, prise d'un antalgique simple (paracétamol sauf CI)

- **Surveillance de 15' supprimée sauf pour certains cas<sup>16</sup>**
- **Conseils au patient**

- Recueil de la goutte de sang avec la compresse \*
- Application du pansement
- Pas de recapuchonnage de l'aiguille
- Elimination des déchets dans la boîte DASRI<sup>8</sup>

- **Réactions retardées<sup>12</sup> (en moy 8 jours)** :
- Réaction douloureuse locale, prurigineuse, érythémateuse au site d'injection
- **Symptôme évocateur d'une HTA** (malaise, céphalées, vertiges...) → Contrôle de la PA pour prise en charge médicale précoce
- Essoufflement (dyspnée), douleurs dans la poitrine, palpitations ou rythme cardiaque irrégulier

- Survenue d'un malaise vagal ou choc anaphylactique → Conduite à tenir spécifique<sup>11</sup> : <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie>
- Autres problèmes → Consultation médicale

- **Traçabilité**
- **Tarification : Vaccination et renseignement Vaccin-Covid**
- **Prise de RV 2<sup>de</sup> dose**

**Enregistrement** nom du vaccin, n° lot, date, heure et lieu de l'administration dans dossier patient et **VACCIN-COVID<sup>3</sup>**  
<https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil>

**Consultation médicale immédiate**

**2<sup>de</sup> dose entre J21 et J49 après la 1<sup>ère</sup> dose**

**Modalités de RAPPEL à 3 mois<sup>14</sup>** Service de calcul de la date du rappel vaccinal : <https://monrappelvaccinocovid.ameli.fr/>

**Modalités pour personne immunodéprimée<sup>15</sup>**

- **Remise au patient**
- Attestation de vaccination européenne avec QR Code<sup>13</sup>
- Synthèse de vaccination

## Liste des contre-indications à la vaccination Covid

### CI médicales faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 :

- Les CI inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
  - Antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier PEG et par risque d'allergie croisée aux polysorbates
  - Réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une précédente injection d'un vaccin contre la COVID posée après expertise allergologique
  - Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (CI commune au vaccin Vaxzevria et Janssen)
  - Personnes qui ont présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria
- Recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (1<sup>ère</sup> dose) :
  - Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par SARS-CoV-2
  - Des myocardites ou myopéricardites associées à une infection par SARS-CoV2
- Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à une dose précédente de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ...).
- Une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRM) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la Covid-19

### CI médicales temporaires faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 :

- Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2
- Myocardites ou péricardites d'étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives
- Infection de moins de 2 mois à la Covid-19

- RCP COMIRNATY 30µg prêt à l'emploi :

[https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty\\_spc\\_french\\_-prefilled\\_grey\\_-28feb2022\\_0.pdf](https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty_spc_french_-prefilled_grey_-28feb2022_0.pdf)

- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 2-4 et annexe 2 :

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-04-01>

- Ministère : La stratégie vaccinale et la liste des publics prioritaires : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19>

## Liste des précautions (prescription et administration)

**Précautions à la prescription du vaccin** : le pharmacien peut prescrire le vaccin COMIRNATY à toute personne à l'exception des :

- Femmes enceintes
- Personnes présentant un trouble de l'hémostase (les personnes sous traitement anticoagulant ne sont pas concernées par cette restriction)
- Personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1<sup>ère</sup> injection
  - ➔ Ces personnes ne sont pas éligibles à la prescription du vaccin contre la Covid en pharmacie et devront être orientées vers le médecin traitant ou la sage-femme

**Précautions à l'administration du vaccin** : le pharmacien (préparateur, étudiant) peut administrer le vaccin à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 5 VII ter :

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-05-07>

## Conservation et stockage

### Flacon non ouvert

- ✓ **Flacon congelé** : Entre -90° et -60°C : **9 mois**
- ✓ **Flacon décongelé** : Entre 2 et 8°C : **10 semaines** au maximum à l'abri de la lumière  
 Entre 8 et 30°C : maximum **12 heures** après son retrait du réfrigérateur  
 → Une fois décongelé, le vaccin ne doit pas être recongelé

**Flacon après reconstitution** : Entre 2 et 30°C : **12h** (point de vue microbiologique, utilisation **immédiate**)

DGS-Urgent 2022\_44 01/04/22 : Livraisons du vaccin Pfizer-Biontech à partir du 15 avril et ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 4 et 5 avril et les 11 et 12 avril 2022 : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent\\_n2022-44\\_livraisons\\_et\\_ouverture\\_du\\_portail\\_.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n2022-44_livraisons_et_ouverture_du_portail_.pdf)

RCP COMIRNATY 30µg prêt à l'emploi :

[https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty\\_spc\\_french\\_-prefilled\\_grey\\_-28feb2022\\_0.pdf](https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty_spc_french_-prefilled_grey_-28feb2022_0.pdf)

## Remplissage en seringues individuelles Pfizer 30µg

1. Effectuer **une hygiène des mains** avec un produit hydro-alcoolique
2. **Désinfecter à nouveau l'opercule** du flacon **prêt à l'emploi** avec une compresse imbibée de solution antiseptique ou d'alcool à 70° (temps de contact 1 minute)
3. **Etiqueter les seringues** : nom, n° de lot, date et heure de prélèvement, date et heure limite d'utilisation  
 → **Reconstitution +12h**
4. Utiliser des seringues serties à faible volume mort de 1ml ou monter une aiguille de 23G ou 25G, d'une longueur adaptée à la corpulence du patient et permettant une injection IM (deltoïde), sur une seringue de 1ml et **prélever 0,3ml**
5. Remettre soigneusement le protecteur de l'aiguille sur la seringue. Déposer la seringue préparée sur un plateau récepteur préalablement nettoyé / désinfecté
6. Prélever successivement **6 à 7 seringues de vaccin**, à raison de 0,3 ml par seringue
7. En fonction de l'organisation retenue, les 6 à 7 seringues peuvent être préparées en une fois et déposées sur un plateau de soins
8. Le plateau constitué est **conservé au maximum 12h** entre 2 et 30°C à compter de l'heure de dilution, mais de préférence au réfrigérateur à 2-8°C

### Transport

- Convenir d'une heure d'enlèvement des seringues : utilisation dans la journée, réservation par les effecteurs
- Maintien à 2-8°C : utilisation d'une pochette isotherme type Igloo (Sofrigam) ou autre dispositif maintenant entre 2 et 8°C
- Prévoir un système d'invulnérabilité qui garantit que le dispositif n'a pas été ouvert
- Transport rapide en limitant les secousses (25' avec T° extérieure de 20°C)

### Tracabilité

- Date/ heure de l'enlèvement des seringues par les personnes habilitées à prescrire et injecter
- Nom du ou des patients si besoin, sur la pochette
- Nom/ Profession/ Coordonnées de l'effecteur

### Etiquetage de la pochette

- Nom du vaccin, numéro de lot, date d'expiration, date et heure de la reconstitution de la seringue
- Date et heure limite d'utilisation à partir de l'heure de la dilution (**+12 heures**)

- RCP COMIRNATY 30µg prêt à l'emploi :

[https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty\\_spc\\_french\\_-prefilled\\_grey\\_-28feb2022\\_0.pdf](https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty_spc_french_-prefilled_grey_-28feb2022_0.pdf)

- PFIZER : Guide de préparation et d'administration du vaccin COMIRNATY : [https://www.comirnatyeducation.fr/files/COMIRNATY-Guide-de-pr%C3%A9paration-et-administration-du-vaccin\\_L20\\_20211213.pdf](https://www.comirnatyeducation.fr/files/COMIRNATY-Guide-de-pr%C3%A9paration-et-administration-du-vaccin_L20_20211213.pdf)



**Point d'attention : RISQUE de CONFUSION entre**  
**COMIRNATY 30µg prêt à l'emploi, à diluer et 10µg (pédiatrique)**

- ➔ **A partir du 15 avril 2022** : tous les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) commandés à partir du lundi 4 avril seront livrés en forme « prête à l'emploi » pour tous les professionnels de ville.
- ➔ Attention au risque de confusion lors de la coexistence des 3 types de COMIRNATY® dans le frigo
- ➔ Les dispositifs médicaux à utiliser (seringues et aiguilles) pour le vaccin prêt à l'emploi restent les mêmes que pour le vaccin à diluer

**LES DIFFÉRENTES FORMES DE VACCIN COMIRNATY® (PFIZER BioNTech)**

	<b>COMIRNATY® 30µg PRÊT : PRÉ-DILUÉ LIVRABLE à partir du 14/04/22</b>	<b>COMIRNATY® 30µg A DILUER Non commandable actuellement</b>	<b>COMIRNATY® 10µg Pédiatrique à diluer</b>
	<b>GRIS</b>	<b>VIOLET</b>	<b>ORANGE</b>
Couleur du couvercle	 Couvercle gris Ne pas diluer	 Couvercle violet Après dilution	 Couvercle orange Après dilution
Présentation	Flacon multidose de 2,25ml	Flacon multidose de 0,45ml	Flacon multidose de 1,3ml
Nb de doses officielles/flacon	6	6	10
Volume d'une dose	0,3ml	0,3ml	0,2ml
Aspect	Dispersion de couleur blanche à blanc cassé, exempte de particules visibles	Avant dilution, la dispersion décongelée peut contenir des particules amorphes opaques de couleur blanche à blanc cassé	
Aspect dilué		Dispersion de couleur blanche à blanc cassé, exempte de particules visibles	
Reconstitution /Préparation	<b>NON</b> Pas de reconstitution vaccin prêt à l'emploi	<b>OUI reconstitution</b> Dilution : vaccin décongelé dilué dans son flacon avec <b>1,8ml</b> de NaCl à 9mg/ml (0,9%), avec une aiguille de 21G ou plus fine	<b>OUI reconstitution</b> Dilution : vaccin décongelé dilué dans son flacon avec <b>1,3ml</b> de NaCl à 9mg/ml (0,9%), avec une aiguille de 21G ou plus fine
Conservation Flacon non ouvert	Entre -90 et -60°C : <b>9 mois</b> Entre 2 et 8°C : <b>10 semaines</b> Entre 8 et 30°C : <b>12 heures</b> A l'abri de la lumière	Entre -90 et -60°C : <b>9 mois</b> Entre -25 et -15°C : <b>2 semaines</b> Entre 2 et 8°C : <b>1 mois</b> Entre 8 et 30°C : <b>2 heures</b> A l'abri de la lumière	Entre -90 et -60°C : <b>9 mois</b> Entre 2 et 8°C : <b>10 semaines</b> Entre 8 et 30°C : <b>12 heures</b> A l'abri de la lumière
Transport	Entre 2 et 8°C : <b>10 semaines</b>	Entre 2 et 30°C : <b>6 heures</b>	Entre 2 et 8°C : <b>12 heures</b>
Conservation après reconstitution - préparation 1 <sup>er</sup> prélèvement	Entre 2 et 30°C : <b>12 heures</b> Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)	Entre 2 et 30°C : <b>6 heures</b> Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)	Entre 2 et 30°C : <b>12 heures</b> Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)
Personnes éligibles	AMM : Personnes ≥12 ans <b>mais réservé aux personnes &lt; 30 ans</b>		Enfant de 5 à moins de 12 ans
Schéma de vaccination	<b>2 doses entre J+21 et J+49</b> 28 jours pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes sévèrement immunodéprimés si le médecin le décide		<b>2 doses à 3 semaines d'intervalle</b>
Si nécessité d'un rappel	OUI selon modalités en cours		

Selon les RCP des vaccins et stratégie vaccinale en cours

URPS PH GE - 05 avril 2022

DGS-Urgent 2022\_44 01/04/22 : Livraisons du vaccin Pfizer-Biontech à partir du 15 avril et ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 4 et 5 avril et les 11 et 12 avril 2022 : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent\\_n2022-44\\_livraisons\\_et\\_ouverture\\_du\\_portail.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n2022-44_livraisons_et_ouverture_du_portail.pdf)

RCP COMIRNATY® 30µg pré-dilué : [https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty\\_spc\\_french\\_prefilled\\_grey\\_-28feb2022\\_0.pdf](https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty_spc_french_prefilled_grey_-28feb2022_0.pdf)

RCP COMIRNATY® 10 et 30µg à diluer : [https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220228155228/anx\\_155228\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220228155228/anx_155228_fr.pdf)

Les recommandations de cette fiche sont basées sur les connaissances actuellement disponibles et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, de l'évolution de l'épidémie actuelle COVID-19 et des stocks de protections disponibles en France

### Liens disponibles

1. Stratégie vaccinale : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19>
2. DGS-Urgent 2021\_117 09/11/21 : Adaptation de la place du vaccin Moderna dans la stratégie vaccinale : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent\\_no117\\_-\\_rappels\\_moderna.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no117_-_rappels_moderna.pdf)
3. Portail de connexion à VACCIN-COVID : <https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil>
4. Questionnaire pharmacien : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche\\_-\\_questionnaire\\_vaccination\\_contre\\_la\\_covid-19.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_contre_la_covid-19.pdf)
5. Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 5 VII ter : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-05-07>
6. Avis du 27/09/21 : Covid-19 et grippe : la HAS précise les conditions d'une co-administration des vaccins : [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-precise-les-conditions-d-une-co-administration-des-vaccins#:~:text=questions%20qui%20subsistent,-\\_Vacciner%20contre%20la%20grippe%20et%20la%20Covid%2D19%20lors%20du,elle%20ne%20comporte%20aucun%20danger](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-precise-les-conditions-d-une-co-administration-des-vaccins#:~:text=questions%20qui%20subsistent,-_Vacciner%20contre%20la%20grippe%20et%20la%20Covid%2D19%20lors%20du,elle%20ne%20comporte%20aucun%20danger)
7. Recueil de consentement [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche\\_-\\_le\\_recueil\\_du\\_consentement.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_le_recueil_du_consentement.pdf)
8. Le traitement des déchets (flacons de vaccins, aiguilles, autres composants utilisés pour la préparation et l'administration) doit suivre une filière d'élimination des déchets DASRI : [https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP4\\_COVID\\_PHARMA\\_VACCINTESTS.pdf](https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP4_COVID_PHARMA_VACCINTESTS.pdf)
9. RCP COMIRNATY 30µg prêt à l'emploi : [https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty\\_spc\\_french\\_-\\_prefilled\\_grey\\_-28feb2022\\_0.pdf](https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty_spc_french_-_prefilled_grey_-28feb2022_0.pdf) et PFIZER : Guide de préparation et d'administration du vaccin COMIRNATY : [https://www.comirnatyeducation.fr/files/COMIRNATY-Guide-de-pr%C3%A9paration-et-administration-du-vaccin\\_L20\\_20211213.pdf](https://www.comirnatyeducation.fr/files/COMIRNATY-Guide-de-pr%C3%A9paration-et-administration-du-vaccin_L20_20211213.pdf)
10. HAS : Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 – Extension des compétences vaccinales des professionnels de santé (mars 2021) P13 : [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/strategie\\_de\\_vaccination\\_contre\\_le\\_sars-cov-2\\_extension\\_des\\_comp%C3%A9tences\\_vaccinales\\_des\\_professionnels\\_de\\_sante.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_extension_des_comp%C3%A9tences_vaccinales_des_professionnels_de_sante.pdf)
11. Prise en charge de l'anaphylaxie : <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie>
12. ANSM Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 : <https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-08-04-2022-au-21-04-2022>
13. Ameli : 27/05/21 Covid-19 : l'attestation de vaccination à remettre au patient disponible dans Vaccin Covid : <https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/covid-19-lattestation-de-vaccination-remettre-au-patient-disponible-dans-vaccin-covid>
14. DGS 2021\_136 28/12/21 : Raccourcissement à 3 mois du délai entre la primovaccination et le rappel et éligibilité au rappel des adolescents à risque de formes graves de Covid-19 : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent\\_136\\_raccourcissement\\_rappel\\_3\\_mois\\_vf.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_136_raccourcissement_rappel_3_mois_vf.pdf)
15. DGS-Urgent 2022\_16 28/01/22 : Vaccination contre la covid-19 des personnes sévèrement immunodéprimées et de l'entourage des personnes à risque de formes graves de la maladie : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent\\_no2022-16\\_vaccins\\_personnes\\_immunodeprimees\\_.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimees_.pdf)
16. DGS-Urgent 2022\_04 05/01/22 : Vaccination contre la Covid-19 : (1) suppression du délai de surveillance de 15 minutes post rappel pour certains publics (2) ajustement du délai entre deux doses de vaccin pédiatrique : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs\\_urgent\\_2022\\_04\\_surveillance\\_15\\_delai\\_vaccin\\_pedia.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2022_04_surveillance_15_delai_vaccin_pedia.pdf)

### Autres sources

- RCP COMIRNATY 30µg prêt à l'emploi : [https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty\\_spc\\_french\\_-\\_prefilled\\_grey\\_-28feb2022\\_0.pdf](https://www.pfizermedicalinformation.fr/sites/default/files/attachments/comirnaty_spc_french_-_prefilled_grey_-28feb2022_0.pdf)
- Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des pharmaciens (janvier 2022) : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio\\_pharmacies.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf)
- Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des vacinateurs (avril 2022) : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio\\_vaccination\\_anticovid\\_professionnels\\_de\\_sante.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf)
- Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038409863/2019-04-26>

Les recommandations de cette fiche sont basées sur les connaissances actuellement disponibles et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, de l'évolution de l'épidémie actuelle COVID-19 et des stocks de protections disponibles en France