

Éligibilité de la personne



Éligibilité

Adulte > 35 ans avec IMC >25

OUI

Proposition du Findrisc



Critères d'exclusion:

- Diabétique connu
- Femme enceinte
- Patients ayant pris des corticoïdes dans les 7 jours précédents

Acceptation réalisation Findrisc

NON

Pas de dépistage à l'officine

OUI

Réalisation du Findrisc

Findrisc ≥ 12

Findrisc < 12

Pas de risque augmenté de développer un diabète

- **Conseils hygiéno-diététiques**
- Glycémie capillaire possible à la demande du patient (non inclus dans DIA-DEP)

Proposition de test d'évaluation de glycémie capillaire
Recueil du consentement écrit de la personne

NON

Pas de dépistage en officine

- Consultation médicale conseillée
- Conseils hygiéno-diététiques

OUI

Préparation au prélèvement

- Vérification du fonctionnement du lecteur à usage partagé
- Préparation de lancette à usage unique et bandelette
- Boîte de recueil déchets piquants DASRI
- (Essuie-main papier pour la personne)



Glycémie capillaire

(1)

- Position assise de la personne
- Repérage du doigt choisi
- Prélèvement de la goutte de sang

- Activation de la circulation capillaire en massant le doigt
- Lavage des mains de la personne à l'eau chaude
- Compression en dessous de la zone à ponctionner

- Lavage des mains du pharmacien à l'eau savonneuse ou solution hydroalcoolique
- Gants non stériles, si possible non poudrés
- Utilisation de l'autopiqueur sur le bord externe du doigt¹
- Introduction de la bandelette dans le lecteur
- Aspiration de la goutte de sang par la bandelette
- Élimination des déchets dans la boîte DASRI

Lecture de glycémie

²A jeun : n'ayant ni mangé ni bu depuis au moins 3 heures

< 1,10g/l si à jeun²
< 1,40 g/l si non à jeun

$\geq 1,10g/l$ si à jeun²
 $\geq 1,40 g/l$ si non à jeun

$\geq 2g/l$ si à jeun²
ou non à jeun

Après le prélèvement

Glycémie capillaire normale

Glycémie capillaire anormale

Glycémie capillaire anormale

Remise à la personne de :

- Fiche de résultat + traçabilité
- Conseils hygiéno-diététiques

Remise à la personne du résultat + traçabilité

- Orientation vers médecin pour prise en charge et diagnostic (glycémie veineuse)
- Transmission du résultat au médecin avec l'accord du patient
- Conseils hygiéno-diététiques

Le pharmacien contacte directement le médecin

Orientation

MÉDECIN

LABORATOIRE

Glycémie veineuse à jeun³

³A jeun : n'ayant ni mangé ni bu depuis au moins 8 heures

1,10 < Glycémie < 1,25 g/l

1,26 ≤ Glycémie < 2 g/l

Glycémie ≥ 2 g/l

Pré-diabète

2^{ème} glycémie veineuse pour confirmation diabète

Diabète confirmé

Prise en charge médicale

Prise en charge médicale