


Avant la vaccination



Éligibilité du patient selon stratégie vaccinale¹

Toutes les personnes éligibles à la vaccination selon stratégie nationale¹ :
Toutes personnes ≥ 55 ans (avec ou sans comorbidités ou pathologies à très haut risque de forme grave de Covid² y compris personnes ≥ 55 ans entourant les immunodéprimés¹²)

- Connexion VACCIN-COVID³ : Vérifier si patient déjà vacciné
- Questionnaire de santé⁴



Pas de vaccination dans l'immédiat

Infection Covid ou TAG+ ou PCR+ au cours des 2 derniers mois

Vaccination possible après un délai de 2 mois → 1 dose unique si immuno-compétente

Autre vaccin reçu au cours des 2 dernières semaines

Vaccination possible après un délai > 14 jours

Précautions

- Personne avec un trouble de l'hémostase⁵
- Femme enceinte/allaitante
- Personnes ayant eu une réaction anaphylactique à un composant du vaccin

Orientation Médecin traitant ou Sage-femme



Non éligible en pharmacie (prescription)¹⁴

Présence de fièvre, maladie aiguë

Report de la vaccination



- **Très fréquents** : céphalées, nausées, myalgies, fatigue, douleur au point d'injection
- **Fréquents** : toux, arthralgie, fièvre, érythème ou gonflement au point d'injection, frissons
- **Indéterminés** : anaphylaxie, syndrome de fuite capillaire

Information des potentiels effets indésirables

- **Peu fréquents** : tremblements, éternuements, douleur oropharyngée, éruption cutanée, hyperhidrose, faiblesse musculaire, douleur dorsale ou des extrémités, asthénie, malaise
- **Rares** : hypersensibilité, urticaire, thrombose associée à une thrombocytopénie, syndrome de Guillain-Barré

Recueil du consentement du patient⁶

Pas de vaccination à l'officine



L'injection

- Ne pas secouer ni diluer
- Utiliser une technique d'asepsie rigoureuse
- Vérifier l'aspect : suspension incolore à légèrement jaune, claire à très opalescente sans particules
- Prélever 0,5 mL de solution du flacon multidose avec 1 seringue et 1 aiguille appropriée
- Étiqueter le flacon : Date et heure d'ouverture +/- heure de sortie du réfrigérateur
- Étiqueter la seringue (si préparation à l'avance) : Nom du vaccin, n° lot, date et heure limite d'utilisation
- En cas de casse du flacon : désinfection avec désinfectant actif sur les adénovirus⁸

Préparation à l'injection

- Port du masque, désinfection des surfaces
- Gants (non obligatoire mais recommandé)
- Compresses stériles + antiseptique
- Pansement
- Boîte de recueil DASRI⁷
- Trousse de secours
- Lavage des mains

Préparation du vaccin

- Position assise de la personne
- Repérage de la zone d'injection
- Désinfection avec temps de contact et séchage du produit adapté

- Absence de problème cutané au point d'injection : cicatrice, inflammation, démangeaisons, douleur... *
- Personne avec tatouage : ne pas piquer dans l'encre *
- Personne avec curage axillaire : vacciner côté opposé *

Personne sous anticoagulants



Injection IM dans le deltoïde⁹

- Aiguille petit calibre
- Pression point injection 2' sans masser ni froter
- Information : risque hématome

Après l'injection

Réactions locales (œdème, rougeur, induration) ou transitoires (fièvre, douleur) → **Traitement symptomatique** : application de froid, prise d'un antalgique simple (paracétamol sauf CI) *

Injection IM dans le deltoïde⁹

- Recueil de la goutte de sang avec la compresse *
- Application du pansement *
- Pas de recapuchonnage de l'aiguille *
- Elimination des déchets dans la boîte DASRI⁷ *

Surveillance du patient 15'

- Absence de réaction *
- Survenue d'un malaise vagal ou choc anaphylactique → Conduite à tenir spécifique¹⁰ : <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie> *
- Autres problèmes → Consultation médicale *

Conseils au patient

- Si essoufflement, douleurs thoraciques, gonflement des jambes, douleur abdominale persistante
- Si symptômes neurologiques (maux de tête sévères ou persistants ou vision floue), ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site d'injection après quelques jours¹¹

Traçabilité

Tarification : Vaccination et renseignement VACCIN-COVID

Enregistrement nom du vaccin, n° lot, date, heure et lieu de l'administration dans dossier patient et VACCIN-COVID³ <https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil>

- Remise au patient**
- Attestation de vaccination européenne avec QR Code¹³
 - Synthèse de vaccination

Consultation médicale immédiate

Liens disponibles

1. Stratégie vaccinale : priorisation des personnes éligibles / Liste des comorbidités / Liste des professionnels de santé concernés par la vaccination : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19>
2. Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre la COVID-19 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
3. Portail de connexion à VACCIN-COVID : <https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-covid-psc/accueil>
4. Questionnaire pharmacien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_contre_la_covid-19_en_officine.pdf
5. Troubles de l'hémostase : anomalies plaquettaires, thrombopathies, maladies spécifiques (hémophilie...) : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240076/fr/covid-19-quels-leviers-pour-vacciner-plus-vite-les-personnes-les-plus-vulnérables
6. Consentement : Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des médecins et infirmiers p6 (SPILF maj 05/03/2021) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
7. Le traitement des déchets (flacons de vaccins, aiguilles, autres composants utilisés pour la préparation et l'administration) doit suivre une filière d'élimination des déchets DASRI : https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP4_COVID_PHARMA_VACCINTESTS.pdf
8. Les surfaces sur lesquelles du vaccin a été renversé doivent être désinfectées avec un désinfectant ayant une activité sur les virus (peroxydes, halogénés, aldéhydes, éviter les ammoniums quaternaires) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_a3_-_janssen.pdf
9. Préparation et modalités d'injection du vaccin Covid -19 Vaccine Janssen : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-19_vaccine_janssen.pdf
10. Prise en charge de l'anaphylaxie : <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-pratiques/Allergies-et-autres-contre-indications/Prise-en-charge-de-l-anaphylaxie>
11. ANSM 30/04/21 : COVID-19 Vaccine Janssen : lien entre le vaccin et la survenue de thromboses en association avec une thrombocytopénie : DGS-Urgent n°2021_36 22/03/21 : Point sur la pharmacovigilance du vaccin Covid-19 AstraZeneca : <https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/covid-19-vaccine-janssen-lien-entre-le-vaccin-et-la-survenue-de-thromboses-en-association-avec-une-thrombocytopenie>
12. HAS 30/04/21 : Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Vaccination prioritaire de l'entourage des personnes immunodéprimées contre le SARS-Cov 2 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264056/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-prioritaire-de-l-entourage-des-personnes-immunodeprimees-contre-le-sars-cov-2
13. Ameli : 03/05/21 Covid-19 : l'attestation de vaccination à remettre au patient disponible dans Vaccin Covid : <https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/covid-19-lattestation-de-vaccination-remettre-au-patient-disponible-dans-vaccin-covid>
14. Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, art 5 : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-07-29>

Autres sources

- RCP Janssen : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_fr.pdf
- Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des pharmaciens (avril 2021) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_pharmacies.pdf
- Portfolio « Vaccination anti-Covid » à destination des vaccinoteurs (avril 2021) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
- DGS-urgent 07/03/21 N°2021_26 : Campagne De Vaccination En Officine Contre La Covid-19 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_26_vaccination_pharmaciens.pdf
- Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038409863/2019-04-26>

Les recommandations de cette fiche sont basées sur les connaissances actuellement disponibles et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, de l'évolution de l'épidémie actuelle COVID-19 et des stocks de protections disponibles en France