



Démarche de prise en charge : Étude PRÉMATIQ 2023 Prévention des Maladies vectorielles à Tiques à l'officine

Personne se présentant spontanément à la pharmacie sans prescription pour une problématique concernant une tique :
Piqûre sur humain

Personne se présentant spontanément à la pharmacie sans prescription pour une problématique concernant une tique :
Piqûre sur animal

Présence de la tique

Absence de tique

- Tique retirée par la personne
- Suspicion de tique tombée après promenade
- Pas de « souvenir » de piqûre mais présence ou non de signes évocateurs

- Conseils et remise de documents
- Signalement tique
- Remise questionnaire patient
- Orientation vers le vétérinaire si nécessaire

Tique entière



Tique partiellement extraite



- Absence de signes généraux ou focaux
- mais patient inquiet

Conseils de retrait

- Extraction mécanique **le plus tôt possible** avec un crochet à tique ou une pince fine
- Désinfection de la peau au point de piqûre avec un antiseptique

Si seul le rostre est présent

- Si patient inquiet
- ou**
- Si plaie infectée ou inflammatoire

- Signes généraux : douleurs, fièvre, fatigue inexpliquée
- Signes focaux : atteinte dermatologique (érythème migrant ailleurs qu'au site de piqûre), articulaire, neurologique...

Orientation vers le médecin traitant



- Conseils et remise de documents d'information
- Surveillance de la zone durant 4 semaines
- Remise questionnaire patient
- Signalement tique

Si apparition :

- Signes généraux : douleurs, fièvre, fatigue inexpliquée
- Signes focaux : atteinte dermatologique (érythème migrant ailleurs qu'au site de piqûre, escarre d'inoculation), articulaire, neurologique...

- Conseils et remise de documents d'information
- Surveillance de la zone durant 4 semaines
- Remise questionnaire patient
- Signalement tique

- Si patient encore inquiet
- Si doute