

DOSE ADDITIONNELLE : DÉBUT de CAMPAGNE 3 OCTOBRE 2022

MODALITÉS DE DOSE ADDITIONNELLE

- Une dose additionnelle de vaccin contre la Covid est recommandée pour les personnes fragiles et leur entourage **QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE RAPPELS REÇUS (ZÉRO, 1 OU 2 RAPPELS) DU MOMENT QUE LE SCHÉMA DE PRIMOVACCINATION EST COMPLET** (deux doses ou une dose + une infection ou une infection + une dose).
- Les vaccins bivalents **SPIKEVAX® Original/ Omicron BA.1 Moderna** et **COMIRNATY® Original/ Omicron BA.4/5 Pfizer** sont réservés aux rappels. La primovaccination se réalise toujours avec les vaccins d'origine monovalents.
- Pour les personnes < 30 ans, le vaccin COMIRNATY® Pfizer est recommandé, le SPIKEVAX® Moderna étant réservé aux personnes > 30 ans
- La saisie de la dose additionnelle dans « **Vaccin Covid** » se fera dans l'onglet déroulant : « **rappel ou rappel concomitant grippe** », le vaccin saisi sera : SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.1 ou COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.5.
- La possibilité de pratiquer une injection concomitante avec le vaccin antigrippal est toujours en vigueur, sur 2 sites d'injection distincts.
- Le maintien des gestes barrières et des mesures de distanciation physique pour les personnes à risque de forme sévère et leurs aidants restent essentiels.

POPULATION ÉLIGIBLE À LA DOSE ADDITIONNELLE



Résidents d'EHPAD et USLD quel que soit leur âge



Personnes > 60 ans



Personnes immunodéprimées ou souffrant de comorbidité quel que soit l'âge



Femmes enceintes dès le 1er trimestre de grossesse



Personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des immunodéprimés ou vulnérables (y compris les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social)

DÉLAI D'ADMINISTRATION DE LA DOSE ADDITIONNELLE

- Pour les personnes âgées > 80 ans
- Pour les résidents en EHPAD et en USLD
- Pour les personnes sévèrement immunodéprimées quel que soit leur âge

3 mois après la dernière injection ou infection

- Pour toutes les autres personnes éligibles

(Personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités, personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des immunodéprimés ou vulnérables (y compris les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social))

• 6 mois après la dernière injection
• 3 mois après l'infection en respectant 6 mois après la dernière injection

- DGS-Urgent n°2022-79 : Lancement de la campagne automnale de vaccination contre le Covid-19 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-79_lancement_de_la_campagne_automnale_de_vaccination_contre_le_covid-19.pdf
- Communiqué de presse du ministre F. Braun du 29/09/22 : <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/covid-19-lancement-de-la-campagne-de-vaccination-automnale-pour-les-publics>
- Communiqué de la HAS du 20/09/2022 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3368002/fr/covid-19-la-has-integre-les-vaccins-bivalents-dans-la-strategie-de-vaccination-pour-l-automne
- Ministère de la santé et de la prévention : La campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 : <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-campagne-de-vaccination-automnale-contre-le-covid-19>

Automne 2022 : quel vaccin pour quel public



QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE ?

Ma situation	Mon âge	Pfizer bivalent	Moderna bivalent	Quand ?
	60 à 79 ans	✓	✓	Dès 6 mois après ma dernière injection*
	80 ans et plus	✓	✓	Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection
Je suis résident en EHPAD ou en USLD		✓	✓	Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection
Je suis immunodéprimé	12 à 29 ans	✓		Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection
	30 ans et plus	✓	✓	
Je suis à risque de forme grave de Covid-19	12 à 29 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*
	30 à 59 ans	✓	✓	
Je suis enceinte (dès le 1 ^{er} trimestre de grossesse)	Moins de 30 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*
	30 ans et plus	✓	✓	
Je suis en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables	12 à 29 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*
	30 ans et plus	✓	✓	

* En cas d'infection récente au Covid-19, la vaccination est recommandée dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.

Si je débute la vaccination

Mon âge	Ma situation	Pfizer-BioNTech	Moderna	Novavax
5 à 11 ans		✓ forme pédiatrique		
12 à 29 ans		✓		
30 ans et plus		✓	✓	
18 ans et plus	J'ai une contre-indication ou je souhaite une alternative aux vaccins à ARN-m			✓

N.B. :

- Pour les rappels, les autorités scientifiques recommandent préférentiellement l'utilisation de vaccins à ARN messenger bivalents.
- Les vaccins bivalents peuvent uniquement être injectés en tant que rappel vaccinal. Pour recevoir cette nouvelle dose dès l'automne, il faut donc être déjà vacciné.
- La vaccination est possible auprès de nombreux professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers...), mais aussi en centres de vaccination, ou à domicile. Pour trouver le lieu de vaccination le plus proche, rendez-vous sur www.sante.fr

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur : www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES VACCINS BIVALENTS au 06/10/2022

	SPIKEVAX® bivalent Original/Omicron BA.1 Moderna 50µg / 50µg/ml	COMIRNATY® bivalent Original/Omicron BA.4-5 Pfizer 15µg / 15µg/ml
Flacon	2,5ml Capsule bleue amovible Dispersion blanche à blanc cassé	2,25ml Capsule grise amovible Dispersion de couleur blanche à blanc cassé
Reconstitution	NON Prêt à l'emploi	
Nb de doses /flacon	5 doses de 0,5ml	6 doses de 0,3ml
Durée de conservation Flacon non ouvert	<ul style="list-style-type: none"> • Congelé entre -50 et -15°C : 9 mois • Entre 2 et 8 °C, à l'abri de la lumière : 30 jours (inclus transport max 12h) • Entre 8 et 25°C : 24h après retrait du frigo 	<ul style="list-style-type: none"> • Entre -90 et -60°C : 12 mois • Entre 2 et 8°C : 10 semaines • Entre 8 et 30°C : 12 heures
Durée de conservation Flacon ouvert	<p style="text-align: center;">Entre 2 et 25°C : 19 heures</p> Point de vue microbiologique : utilisation immédiate	<p style="text-align: center;">Entre 2 et 30°C : 12 heures</p> (inclus transport max 6h) Point de vue microbiologique : utilisation immédiate
Indication	Immunisation active afin de prévenir la COVID causée par le SARS-CoV-2 chez les personnes ≥ 12 ans qui ont déjà reçu au moins un schéma de primo-vaccination RECOMMANDATION Personne > 30 ans	Immunisation active pour la prévention de la COVID causée par le SARS-CoV-2, chez les personnes ≥ 12 ans qui ont déjà reçu au moins un schéma de primo-vaccination RECOMMANDATION Personne ≥ 12 ans
Stratégie vaccinale	<p>RAPPEL après primovaccination</p> <p>Personne ≥ 80 ans, résidents EHPAD et USLD, immunodéprimés quel que soit leur âge :</p> <p style="padding-left: 40px;">→ Dès 3 mois après la dernière injection ou infection</p> <p>Toutes les autres personnes éligibles :</p> <p style="padding-left: 40px;">→ Dès 6 mois après la dernière injection</p> <p style="padding-left: 80px;">→ Dès 3 mois après l'infection</p> <p>(en respectant un délai minimal de <u>6 mois après la dernière injection</u>)</p>	

URPS 29/09/2022

RCP SPIKEVAX® version BA.1 : page 22 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_fr.pdf
 RCP COMIRNATY® version BA.4/5 : page 96 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf

TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES VACCINS MONOVALENTS au 06/10/2022

RCP COMIRNATY® 30µg Pfizer : page 26 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
 RCP COMIRNATY® 10µg pédiatrique Pfizer : page 48 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
 RCP SPIKEVAX® Moderna : page 2 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_fr.pdf
 RCP NUVAXOVID Novavax : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nuvaxovid-epar-product-information_fr.pdf

MÉMO VACCINATION COVID 06/10/2022

VACCIN MONOVALENTS ANTI-COVID UTILISÉS en FRANCE au 06/10/2022				
	COMIRNATY® 30µg PFIZER	COMIRNATY® 10µg pédiatrique PFIZER	SPIKEVAX® MODERNA	NUVAXOVID® NOVAVAX
Couleur du couvercle	GRIS	ORANGE		
Présentation	Flacon multidose de 2,25ml	Flacon multidose de 1,3ml	Flacon multidose de 5ml	Flacon multidose de 5ml
Nb de doses/flacon	6	10	10 (max 11)	10
Volume d'une dose	0,3ml	0,2ml	0,5ml	0,5ml
Aspect	Dispersion de couleur blanche à blanc cassé, exempte de particules visibles	Avant dilution, la dispersion décongelée peut contenir des particules amorphes opaques de couleur blanche à blanc cassé	Dispersion blanche à blanc cassé, peut contenir des particules blanc à blanc cassé	Dispersion incolore à légèrement jaune, limpide à légèrement opalescente, exempte de particules visibles
Aspect dilué		Dispersion de couleur blanche à blanc cassé, exempte de particules visibles		
Reconstitution /Préparation	NON vaccin prêt à l'emploi	OUI reconstitution Dilution : avec 1,3ml de NaCl à 9mg/ml (0,9%)	NON pas de reconstitution Vaccin prêt à l'emploi après décongélation	NON pas de reconstitution Vaccin prêt à l'emploi Ne pas congeler
Conservation Flacon non ouvert	Entre -90 et -60°C : 12 mois Entre 2 et 8°C : 10 semaines Entre 8 et 30°C : 12 heures A l'abri de la lumière	Entre -90 et -60°C : 9 mois Entre 2 et 8°C : 10 semaines Entre 8 et 30°C : 12 heures A l'abri de la lumière	Entre -50 et -15°C : 9 mois Entre 2 et 8°C : 30 jours Entre 8 et 25 °C : 24 heures A l'abri de la lumière	Entre 2 à 8°C : 9 mois A 25°C : 12 heures A l'abri de la lumière
Transport	Entre 2 et 8°C : 10 semaines	Entre 2 et 8°C : 12 heures	Entre 2 et 8°C : 12 heures	Entre 2 et 8°C : 12 heures
Conservation ouverture	Entre 2 et 30°C : 12 heures Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)	Entre 2 et 30°C : 12 heures Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)	Entre 2 et 25 °C : 19 heures Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)	Entre 2 et 25°C : 6 heures Utilisation immédiate (point de vue microbiologique)
Personnes éligibles	AMM : Personnes ≥12 ans Recommandé personnes < 30 ans	Enfant de 5 à moins de 12 ans	AMM : Personnes ≥ 6 ans Réservé aux personnes >30 ans	AMM : Personnes ≥12 ans Personnes ≥ 18 ans Qui ne souhaitent pas recevoir de vaccin à ARN ou qui présentent une contre-indication aux vaccins à ARN
Schéma de vaccination	2 doses entre J+21 et J+49 28 jours pour les personnes > 70 ans et les personnes sévèrement immunodéprimées si le médecin le décide	2 doses à 3 semaines d'intervalle	2 doses entre J+28 et J+49 28 jours pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes sévèrement immunodéprimées si le médecin le décide	2 doses espacées de 21 jours en IM dans le deltoïde (tolérance 18-28 jours)
Si nécessité d'un rappel	Possible mais privilégier les vaccins bivalents	OUI	Possible mais privilégier les vaccins bivalents	AMM Rappel ≥ 18 ans
Selon les RCP des vaccins et stratégie vaccinale en cours				URPS PH GE - 06 octobre 2022