

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025 – Vaccins et modalités

Comme l'année précédente, les 2 campagnes de prévention vaccinale de la Covid19 et de la grippe seront menées de manière conjointe, les populations concernées et risque étant similaire.

Personnes cibles de la campagne de vaccination (Covid-19 et grippe)

- Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus
- Les personnes ≥ 6 mois, atteintes de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie (hypertension artérielle compliquée, maladies chroniques cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénales, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes ayant subi une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence)
- Les personnes immunodéprimées
- Les femmes enceintes
- Les résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD)
- Les personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d'une décision partagée avec les équipes soignantes
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial

→ Toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie d'un groupe à risque, peut recevoir une injection contre la Covid 19

Grippe

Campagne de vaccination Grippe du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025

VACCINS <small>(utilisation indifférente selon l'HAS)</small>	Indication	Schéma de vaccination	Contre-indications
Fluarixtetra® GSK	• Adulte (y compris la femme enceinte) • Enfant à partir de 6 mois	• Dose de 0,5ml • À partir de 6 mois : 1 dose ou 2 doses (si primovaccination) à 1 mois d'intervalle et ensuite 1 dose/an • À partir de 9 ans : 1 dose/an	Hypersensibilité avérée aux substances actives, à l'un des excipients, aux œufs, aux protéines de poulet, aux substances présentes à l'état de traces (antibiotique...)
Influvac Tetra® Mylan			
Vaxigriptetra® Sanofi Pasteur			

Covid

Seul le laboratoire Pfizer a obtenu l'AMM pour des vaccins monovalents adaptés au variant circulant JN.1. V.

Campagne de vaccination Covid du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025

VACCIN à ARNm Monovalent* (Pfizer) stock d'état	Présentation	Conservation	Commande	Fréquence
Comirnaty® JN.1 30µg/dose (bouchon gris) Adulte (12 ans et +)	Prêt à l'emploi Multidose 6 doses de 0,3ml par flacon	Non ouverts 10 semaines entre 2 et 8°C	Kit adm adulte Quota de flacons : 30	Commande hebdomadaire à partir du lundi 23 et mardi 24/09 Distribution par les grossistes-répartiteurs : jeudi ou vendredi de la semaine suivante (S+1)
Comirnaty® JN.1 10µg/dose (bouchon bleu foncé) Pédiatrique (5 ans – 11 ans)		Dans la limite de 18 mois entre -90 et -60°C	Kit adm enfant Quota de flacons : 3	
Comirnaty® JN.1 3µg/dose (bouchon jaune) Pédiatrique (6 mois – 4 ans)	DILUTION 3 doses de 0,3ml par flacon	Non ouverts 10 semaines entre 2 et 8°C Dans la limite de 18 mois entre -90 et -60°C Dilué Entre 2 et 30°C utilisé dans les 12h	NaCl de dilution non proposé à la commande (s'assurer d'en disposer) Kit adm enfant + seringue reconst + aiguille reconst Quota de flacons : 2	

* Toute les autres formes de Comirnaty® sont retirées de la distribution
Nuvaxovid®, Spikevax® et VidPrevtyn Beta® ne seront pas proposés à la commande



Schémas de vaccination Covid

Population	Schéma	Remarque
Nourrissons et enfants de 6 mois à 4 ans	<ul style="list-style-type: none"> • 1 dose de vaccin spécifique à leur âge à partir de 6 mois après la dernière infection ou injection • Primovaccination : 2 doses à 21j d'intervalle + une 3^{ème} dose à 8 semaines après la 2^{ème} 	<ul style="list-style-type: none"> • Si Covid entre la 1^{ère} et la 2^{ème} dose : injecter la seconde dose au moins 3 mois après l'infection --> Schéma complet (pas de 3^{ème} dose) • Si Covid après la 2^{ème} dose : injecter la 3^{ème} et dernière dose au moins 3 mois après l'infection
Personnes ≥ 5 ans	1 seule dose de vaccin quel que soit le passé vaccinal	Délai d'au moins 6 mois (3 mois pour ≥ 80 ans et les immunodéprimés) après la dernière dose de vaccin Covid ou la dernière infection Covid

- L'administration du vaccin se fait à 1 dose de 0,3ml en IM avec une surveillance après vaccination recommandée de 15 minutes
- En cas de contre-indication à un vaccin ARN ou de refus de ce type de vaccin : aucune alternative au vaccin Comirnaty® n'est possible puisque le vaccin Nuvaxovid® (Novavax) adapté au variant XBB.1.5 a été retiré de la distribution et que celui adapté au variant JN.1 n'est pas reçu l'AMM (validé par la FDA aux USA fin août).

Mesures complémentaires

En plus de la vaccination, la prévention de la grippe saisonnière et de la Covid repose également sur le respect des mesures barrières (population générale et milieu de soin) :

- Port du masque en présence de symptômes, dans les lieux très fréquentés, en présence de personnes fragiles et à risque de formes graves
- Aération et la ventilation régulière des espaces clos
- Lavage régulier des mains
- Utilisation de mouchoir à usage unique
- Action de tousser ou d'éternuer dans son coude
- Distanciation physique lors des épidémies

- Pour une synergie des campagnes de vaccination de rappel contre la COVID-19 et de vaccination contre la grippe, la Direction générale de la santé demande aux professionnels de santé de **promouvoir systématiquement les 2 vaccinations auprès des personnes ciblées par les recommandations.**
- Selon la HAS il n'y a pas de délai à respecter entre les 2 vaccinations si elles ne peuvent être réalisées en même temps, si elles sont effectuées le même jour, les vaccins seront injectés chacun dans un bras.

Commande des vaccins Covid

- La commande est hebdomadaire du lundi matin au mardi 23h et débute à partir du lundi 23/09/2024
- Elle se passe sur l'outil dédié de Santé Publique France [Commande de vaccins Covid](#)
- Le pharmacien peut consulter une confirmation de commande avec quantité commandée et date de livraison prévisionnelle dès le mercredi de la commande à partir de 18h00
- La distribution par les grossistes-répartiteurs intervient à J+10 : jeudi ou vendredi de la semaine suivante (S+1)
- L'officine prévient les professionnels de santé pour lesquels elle a commandé

- Il est recommandé de planifier les rendez-vous à partir du lendemain de la date de livraison prévisionnelle indiquée dans la confirmation de commande.

Traçabilité

- La vaccination de la grippe sera tracée selon les modalités habituelles
- La vaccination contre la Covid n'est plus possible via le SI « Vaccin Covid » qui a été arrêté fin juin 2024

- Les nouvelles modalités de suivi des injections Covid 19 seront prochainement précisées par la DGS.

DGS-URGENT N°2024_17 : Campagne de vaccination contre le covid-19 à l'automne 2024 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_-_campagne_de_vaccination_contre_le_covid-19_a_l_automne_2024.pdf

Vaccination-info-service.fr - Covid <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19>

Vaccination-info-service.fr – Grippe saisonnière <https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/Grippe-saisonniere>